



PROTOCOLO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

SÍNDROME DE FOURNIER

DEFINIÇÃO

É a fasciíte necrosante do períneo e genitais caracterizada por extensa necrose de pele, tecido subcutâneo, fácia superficial, com concomitante trombose de micro circulação.

CONDIÇÃO ASSOCIADAS

Diabetes mellitus (20- 40%)

Etilismo (35%)

Trauma

Idade avançada

Má nutrição

Radioterapia

Outros-Insuficiência renal crônica, Insuficiência Vascular periférica, Insuficiência coronariana e cirrose.

Má higiene.

BACTERIOLOGIA

Etiologia multibactericida – 80%

Agente único – 12%

Culturas estéreis – 8%

Bacteróides – 52%

E. coli – 45%

Proteus – 18%

Clostridium – 12%

PATOGENESE

Infecção multibacteria na região ano-retal ou urogenital

Disseminação obedecendo a plano das facias superficiais

Trombose de artérias e arteoríolas

Necrose extensa de pele e subcutâneo e facia superficial





DIAGNÓSTICO

Quadro clínico: Dor súbita- 100%
Sinais flogísticos – 100%
Gangrena de períneo
Sinais de toxemia

Bacteriologia-Geralmente infecção múltipla

TRATAMENTO

Desbridamento sempre que necessário
Antibióticoterapia
Curativos

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

- Pressão de 2,5 ATA;
- Tempo de 90 a 120 minutos, conforme câmara monoplace ou multiplace;
- 10 a 30 sessões em 95% dos casos;
- Continuar OHB até condições de enxertia.

